


Undersøgelse for parasitter

Trin 1



Vask hænderne grundigt.

Trin 2



Placér din ene fod på toilet/stol e.l., som vist på billedet.

Trin 3



Åbn prøvetagningssettet ("fecalSwab").

Du må IKKE røre ved spidsen af podepinden.

OBS: Hæld ikke væsken ud af plastikrøret.

Når du har taget prøven, skal podepinden med spidsen først, ned i plastikrøret.

Trin 4




Brug ikke nogen form for creme eller vaseline, hverken på din krop eller på podepinden.
Brug din foretrukne hånd til at holde på podepinden, lige under "knækket".

Trin 5




Kvindelig anatomi



Mandlig anatomi

Brug den anden hånd til at trække din ene balle lidt ud til siden, så der er nem adgang til endetarmen.

Trin 6



1. Før podepinden 2 cm op i endetarmen, til dine fingre rammer endetarmsåbningen.
2. Når podepinden er på plads, flytter du dine fingre længere ned af podepinden, væk fra din krop og holder fast der.
3. Bevæg forsigtigt podepinden i en lille cirkel, så podepinden samler prøvemateriale fra tarmens inderside.
4. Træk podepinden ud af endetarmsåbningen.
5. Podepinden placeres med spidsen først i plastikrøret (se trin 3).

Trin 7



Vask hænderne grundigt.

Efter aftale med din læge, afleveres prøven til lægen, eller indsendes i det af lægen udleverede materiale.

Prøvesvar fås efter aftale hos egen læge.