

Til patienter og pårørende

Behandling på spacer

med airomir/ventoline



Kvalitet Døgnet Rundt

Børne- og ungeklinikken



Hvilke bivirkninger har Airomir/ Ventoline ?

Man kan få hjertebanken og indre uro og ryste på hænderne. Bivirkningerne ved det går hurtigt over igen, og de er ikke farlige. Hvad skal man passe på ?

- Hvis dit barn ikke får der bedre af det
- Hvis det virker i mindre end 2 timer
- Hvis der er behov for det mere end 8 gange i døgnet Skal dit barn ses af en læge og måske på sygehuset

Læs evt:link til:

[WWW.sygehussonderjylland. dk/ast-
maskole](http://WWW.sygehussonderjylland.dk/astmaskole)

www.astma-allergi.dk

Symptomerne på astma / astmatisk bronchitis:

- Hvæsende og pibende vejrtrækning, ofte i forbindelse med en luftvejsinfektion.
- Øget slimdannelse i barnets luftveje.
- Dit barn kaster slim op.
- Hoste gennem længere tid.
- Natlig hoste og urolig søvn.
- Anfald af åndenød, ofte i forbindelse med anstrengelse,gråd og latter.
- Hyppige lungebetændelser.



Behandling ved udskrivelse:

Andet medicin:

Akut medicin (blå):

Før anstrengelse(10-15 min):

Fast forebyggende (brun,orange)

Plan for nedtrapning af den akutte medicin:

Hastigheden afhænger af dit barns symptomer:

Dag 1 + 2 Hver 3. time om dagen og ved behov om natten

Dag 3 + 5 Hver 4. time om dagen og ved behov om natten

Dag 6 + 7 Morgen - Middag - Aften

Herefter: Kun hvis barnet hoster eller har lyd på vejrtrækningen.

NB: Den forbyggende brune medicin skal fortsætte i den angivne dosis til andet er aftalt med lægen.

Ved et akut anfald af besværet/hvæsende vejrtrækning :

Skal du give dit barn blå medicin via spacer hver 20 min, 2 - 4 gange. Ved manglende effekt efter 2 gange eller utilstrækkelig effekt efter 1 time eller behov for inhalationer hyppigere end hver 2. time bør der tages lægekontakt.

Ved forkølelse, lettere åndenød, tiltagende hoste (især om natten), eller hvæsende vejrtrækning om natten, eller andre tegn til forværring af barnets astma, skal du give.

Akut medicin (blå):

Skal ofte gives hver 3. time til at begynde med.
Ved bedring aftrappes til hver 4 - 6 time og når episoden er ovre ophører behandling.

Skriv i kalenderen (på bagsiden), når du tager akut medicin !!!

Rengøring:

Spaceren skal ved daglig brug vaskes 1 gang om ugen.
Masken skal evt. vaskes hyppigere.
Den skilles ad i 5 dele (maske, spacer, mundstykke, blå ventil og blåt endestykke).
Delene lægges i varmt sæbevand i 15 minutter.
Alle delene stilles til dryptørring på et viskestykke e.lign.

Når delene er helt tørre, samles spaceren igen. Vær opmærksom på at den tynde blå ventil monteres rigtigt på de 4 plastikspidser, samt at mundstykket er skruet helt på.



Skriv i kalenderen, når du tager *ekstra medicin!*

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

Sygehus Sønderjylland
Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
Tlf. 79 97 00 00
www.sygehussonderjylland.dk

regionsyddanmark.dk